



ジャストフィット®

フロアブル

べと病・疫病、 攻めの防除に ジャストフィット。

ほうれんそう、
バジルにも
登録拡大!



タイミングを逃さない攻めの防除で、より良い収穫へ。

- フルオピコリドとベンチアバリカルブイソプロピルの2成分が入っています。
- ローテーション散布に使いやすい薬剤です。



®ジャストフィットはバイエルグループの登録商標



詳しい使い方、
登録内容とSDSは
こちらから



ジャストフィットフロアブル

特長

- ① 2種類の有効成分フルオピコリドとベンチアバリカルブイソプロピルの混合剤で、卵菌類に属するべと病菌や疫病菌に優れた効果を発揮します。
- ② 作用機作の違う2種類の有効成分の混合剤ですので、耐性菌発達のリスクが小さいです。また、既存の薬剤耐性菌に対しても効果を発揮します。
- ③ 予防効果に優れるとともに治療効果も兼ね備えていますので、感染初期段階での病斑拡大も阻止します。
- ④ 優れた浸達性と浸透移行性を有します。
- ⑤ 残効性と耐雨性に優れます。

適用病害および使用方法

2024年9月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当たり 使用液量(ℓ)	使用時期	使用回数*			使用方法
					本剤	フルオピコリド	ベンチアバリカルブイソプロピル	
かんきつ	褐色腐敗病	5,000	200~700	収穫前日まで	3回	3回	3回	散布
ぶどう				収穫30日前まで				
きゅうり				収穫前日まで				
レタス 非結球レタス	べと病	500	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm、使用土壌 約1.5~4ℓ)当たり0.5ℓ	定植前日 ~定植当日	1回	3回 (灌注は1回、 散布は2回)	3回 (灌注は1回、散布は2回)	灌注
はくさい	べと病 白さび病	5,000	100~300	収穫7日前まで	3回	3回	3回	散布
たまねぎ	白色疫病	3,000						
	べと病	24						
ほうれんそう	べと病	5,000	100~300	収穫前日まで	3回	3回	3回	散布
バジル								

*印は本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。


上手な使い方

- 発生前~発生始期に予防的に散布して下さい。
- 感染直後でしたら病斑拡大の阻止効果が期待できます。
- 耐性菌の発達回避のため、作用機作が異なる薬剤をローテーションで散布して下さい。

試験成績

きゅうり べと病に対する防除効果


平成16年 (一社)日本植物防疫協会研究所



品種：シャープ1 定植：4月1日 区制：1区10株 3反復
発生状況：甚発生 散布：5月19日、26日、6月2日 調査：6月9日

はくさい べと病に対する防除効果

平成16年 長野県野菜花き試験場佐久支場



品種：優黄 定植：8月24日 区制：1区50株 3連制
発生状況：甚発生 散布：9月15日、28日、10月5日 調査：10月16日

注意事項

- 散布液調製時には、ビンをよく振って内部の成分をよく攪拌してから量を計って下さい。
- 調製した薬液は、調製した当日に使い切ってください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
 - ① 散布は散布機種種の散布基準に従って実施して下さい。
 - ② 散布に当っては散布機種種に適合した散布装置を使用して下さい。
 - ③ 散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節して下さい。
- 灌注処理する場合は、軟弱徒長苗、未熟苗、高温乾燥時や過剰使用により葉縁に褐変や黄化などの薬害を生じるおそれがあるので注意して下さい。また、本剤が土壌に十分吸収されないおそれがあるので処理直前や直後の灌水はさけて下さい。
- あんずに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲などのないよう注意して下さい。
- 散布の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。