

速効力、使いやすさ、ミツバチへの安全性で!
大切な実りを守る。

ミツバチ
にも
安心です!



合成ピレスロイド系 殺虫・殺ダニ剤

マブリック[®]
EW



- 速効的に殺虫効果を発揮する、合成ピレスロイド系殺虫剤。
- ミツバチへの影響が少なく、果樹の散布に最適。
- ハダニ類をはじめ、幅広い種類の害虫に優れた効果。
- EW製剤により刺激性が低減。薬剤の付着汚れも少ない。





合成ピレスロイド系 殺虫・殺ダニ剤

マブリック®EW

登録番号:第17944号

有効成分:フルバリネート…19.0%

毒性:劇物

殺虫剤分類 3A


医薬用外劇物

上手な使い方

- マブリック®EWのすぐれた特長を生かし、害虫の発生初期を中心に、他剤とのローテーションをはかりながら散布してください。
- 浸透移行性はないので、十分な散布液量で作物全体にかけむらのないよう散布してください。
- 抵抗性発達回避のため、他系統の剤とのローテーション散布を行ってください。
- すもも、あんず、ネクタリンには薬害を生ずる恐れがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。

りんご/モモシンクイガに対する効果


1990年委託試験(青森県りんご試験場)



供試作物:りんご(品種 ふじ) 対象害虫:モモシンクイガ 区制:1区、1~2樹
 処理日:1990年8月8日 処理方法:所定濃度に希釈した薬液を1樹あたり約10ℓ散布した。
 試験方法:孵化直前の卵を散布直後、1、5、10、15日後に1果あたり20卵、計100卵をかくあ部に接種した。
 調査方法:食入が終了した時点で果実を採集し、室内で食入痕数を調査した。

かんきつ/チャバネアオカメムシに対する効果

1991年委託試験(日本植物防疫協会研究所 宮崎試験場)



供試作物:かんきつ(品種 早生温州) 対象害虫:チャバネアオカメムシ 区制:1区1樹、毎回2本の結果枝に放虫
 処理日:1990年8月28日 処理方法:動力噴霧器を用いて十分量散布した。
 調査方法:散布1、2、3、4、7日後に供試虫をコース袋に入れて放虫し、3~4日後に死亡状況を確認した。

適用害虫と使用方法

2024年7月現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アブラムシ類	4000倍	収穫前日まで	100~300 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
ばれいしょ	アブラムシ類、ナガイモコガ		収穫7日前まで				
やまのいも	アブラムシ類、ナガイモコガ		収穫前日まで				
てんさい	ハダニ類、カメノコハムシ、ヨトウムシ	3000~4000倍	収穫前日まで	100~300 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
たまねぎ	ネギアザミウマ		収穫前日まで				
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く)	アブラムシ類	4000倍	収穫7日前まで	100~300 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
あずき	アブラムシ類、ノメイガ類						
だいず	アブラムシ類、マメシンクイガ	2000倍	収穫14日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
なたね	アオムシ						
かんきつ(みかんを除く)	アブラムシ類、ミカンハモグリガ	2000~4000倍	収穫45日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
みかん	カメムシ類、ケシキスイ類、コアオハナムグリ	2000倍					
	チャノキイロアザミウマ	4000倍					
なし	アブラムシ類、ミカンハモグリガ	2000~4000倍	収穫21日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
	カメムシ類、ケシキスイ類、コアオハナムグリ	2000倍					
りんご	チャノキイロアザミウマ	4000倍	収穫30日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類	2000~4000倍					
もも	アブラムシ類	2000倍	収穫21日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
	カメムシ類、ナシモンソガ、シクイムシ類、ナシホソガ、モモシンクイガ	2000倍					
うめ	アブラムシ類、キンモンソガ、シンクイムシ類	4000倍	収穫30日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
	ヒメシロモンドクガ、モモチョッキリゾウムシ						
かき	アブラムシ類	4000倍	収穫30日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内
	イラガ類、チャノキイロアザミウマ、ミノガ類	4000倍					
	カメムシ類、カキノヘタムシガ	2000倍	収穫30日前まで	200~700 ℓ/10a	2回以内	散布	2回以内

注意事項

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

安全使用上の注意

- 医薬用外劇物です。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- のど、鼻、皮膚等を刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。

- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするごとに衣服を交換してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いには十分注意してください。
- 摘果等の作業の際は農業用マスク、手袋、長スボン長袖の作業衣などを着用してください。
- 魚毒性等
 - 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
 - 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。

- 使用残りの薬液が生じないように調整をおこない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な場所にカギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから。



- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

本資料は2024年7月現在の知見に基づき作成しています。