



IBR剤 (Insect Behavior Regulator) 昆虫行動制御剤


農林水産省登録
第22798号

クミアイ コルト®

殺虫剤

顆粒水和剤

害虫防除の馬カアツプ!



無人航空機散布に対応



適用拡大
ズッキーニ
ヤングコーン



（写真はイメージです）

難防除害虫に高い効果!



モモアカアブラムシ



ヤノネカイガラムシ



タバコナジラミ



チャノキイロアザミウマ

かんきつ	トマト、ミニトマト	しよくほおずき・食用ペンタス
りんご	なす	ばれいしょ
なし	ピーマン	かんしょ
もも、ネクタリン	オクラ	こんにゃく
かき	とうがらし類	やまのいも
ぶどう	ヤングコーン	てんさい
マンゴー	未成熟とうもろこし	キャベツ
おうとう	きゅうり、メロン	カリフラワー、ブロッコリー
小粒核果類	ズッキーニ	はくさい
キウイフルーツ	すいか、かぼちゃ	レタス
花き類・観葉植物	しろうり、にがうり	非結球レタス
たばこ	さやいんげん	ねぎ、たまねぎ
茶	豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)	アスパラガス
いちご	豆類(種実、らっかせいを除く)	にら

適用作物

適用病害虫および使用方法

が2024年8月に適用拡大になりました。

<2024年8月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の使用回数
かんきつ	アブラムシ類	16倍	4ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		20倍	5ℓ/10a				
		40倍	10ℓ/10a				
		2000倍					
		2000~3000倍					
りんご	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		4000倍					
		3000~6000倍					
		3000~4000倍					
		3000倍					
なし	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000~4000倍					
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
もも、ネクタリン	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
かき	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
ぶどう	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
キウイフルーツ	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
マンゴー	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
おうとう	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
小粒核果類	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
かんしょ	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
てんさい	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
いちご	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
なす	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
ピーマン	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
しろすり	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
キャベツ	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
レタス	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
非結球レタス	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
ブロッコリー	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
はくさい	アブラムシ類	4000倍		収穫3日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
アスパラガス	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
食用パスタ	アブラムシ類	4000倍		収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
スッキーニ	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	1回	無人航空機による散布	1回
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
ヤングコーン	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
さやいんげん	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
ねぎ	アブラムシ類	4000倍		収穫3日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
たまねぎ	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
にら	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
しょくようほおすき	アブラムシ類	4000倍		収穫3日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
茶	アブラムシ類	4000倍		摘採7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
チューリップ	アブラムシ類	4000倍		発生初期	4回以内	無人航空機による散布	4回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					
花き類・観葉植物(チューリップを除く)	アブラムシ類	4000倍		収穫10日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
		3000倍					
		4000倍					
		2000~3000倍					
		3000倍					

注意事項

●石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性の強い薬剤との混用はさけてください。●植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないようによく散布してください。●ぶどうの幼果期以降に使用する場合は、果粉の溶解を生じるおそれがあるので注意してください。●西洋なしの品種レクチェエでは落花後から袋かけ前までの散布については果実に葉斑を生じるおそれがあるので使用をさけてください。●おうとうに使用する場合は、果実に汚れを生じるおそれがあるので注意してください。●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。①ミツバチやその巣箱及びその周辺に近づかないようしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。②受粉促進を目的としたミツバチの危険防止に努めてください。●無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。①散布は機体の周囲に十分な安全距離を確保してください。②散布に当たっては散布機に搭載された散布装置を使用してください。③散布中、薬液の漏れのないよう機体の散布装置の十分な点検を行ってください。④散布薬液の飛散によって自動車やカーポートの塗装等に被害を生じるおそれがある場合は、散布区域内の諸物件に十分な留意してください。⑤散布終了後は次の項目を守ってください。a) 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。b) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄液は安全な場所に処理してください。●本剤をばれいしょに対して希釈倍数400倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した専用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。●適用作物群に属する作物又はその新品種には本剤をばれいしょに使用してはならない。●本剤の責任において事前に薬書の有無を十分確認してから使用してください。●使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の指導を受け、また、誤って飲み込んだ場合には吐き出さず、直ちに医師の指導を受けさせてください。●眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。●目に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指導を受けさせてください。●散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手洗、顔を洗ってよく洗い、うがいをするともに洗顔してください。●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。●水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。●無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。●散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。 ●防除日誌を記載しましょう。



JAグループ
農協 全農 経済連
全農は登録商標 第4702318号

自然に学び 自然を守る



クミアイ化学工業株式会社
本社：〒110-8782 東京都台東区池之端1-4-26 TEL.03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>

2430 (24-9)



詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから。