

果樹・野菜の病害防除の定番に!!

登録作物
40種類以上!

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!



殺菌剤

ファンタジスタ®

顆粒水和剤

©はクミアイ化学工業(株)の登録商標



特長

- 系統名ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸達性、莖部から上位葉への浸透移行性を有します。



DEFENSE



有効成分：ピリベンカルブ……………40.0%

殺菌剤分類 **11**

人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)



特設サイト



適用病害と使用方法 ■が適用拡大部分

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数			
りんご	黒星病、モニリア病、褐斑病、斑点落葉病、すす点病、黒点病、輪紋病	3000~4000倍	200~700g/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
おうとう	すす斑病、うどんこ病、炭疽病	3000倍								
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病、心腐れ症(胴枯病菌)	3000~4000倍								
かき	炭疽病、褐色斑点病	3000倍								
ぶどう	灰色かび病、晚腐病、黒とう病	3000~4000倍								
もも	さび病、うどんこ病	3000倍								
ネクタリン	うどんこ病	3000倍								
キウイフルーツ	黒星病、灰星病、ホモフシス腐敗病	3000~4000倍								
かんきつ	すす斑病、灰色かび病	4000倍								
小粒核果類(うめを除く)	灰色かび病、そうか病、黒点病	2000~4000倍								
うめ	炭疽病(さび果)	2000倍								
茶	炭疽病、黒星病	3000倍	200~400g/10a	摘採7日前まで	1回	1回				
稲	いもち病	2000倍	60~150g/10a	収穫30日前まで	1回	1回				
小麦	眼紋病、赤さび病	2000~4000倍	赤かび病	2000~4000倍	2000~4000倍	収穫7日前まで	3回以内			
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)	菌核病、灰色かび病	2000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
あずき	菌核病、灰色かび病、炭疽病、さび病	2000倍								
いんげんまめ	菌核病、灰色かび病、炭疽病	2000倍								
そらまめ	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病	2000~4000倍								
だいず	菌核病、灰色かび病	2000~4000倍								
えんどうまめ	紫斑病	2000~4000倍								
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病、灰色かび病	2000倍								
さやいんげん	菌核病、灰色かび病、炭疽病	2000倍								
未成熟そらまめ	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病	2000倍								
えだまめ	菌核病、灰色かび病	2000~4000倍								
さやえんどう	紫斑病	2000~4000倍								
きゅうり	菌核病、灰色かび病、さび病	2000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内				
なす	菌核病、灰色かび病	2000~3000倍								
ピーマン	菌核病、灰色かび病、炭疽病、さび病	2000倍								
トマト、ミニトマト	菌核病、灰色かび病、赤色斑点病、さび病	2000~3000倍								
いちご	炭疽病	2000倍								
キャベツ	菌核病、灰色かび病	2000~3000倍								
はくさい	黒斑病、根朽病、株腐病	2000倍								
はなやさい類*	菌核病、炭疽病、黒斑病、白斑病	3000倍								
レタス	菌核病、黒すす病	2000~3000倍								
非結球レタス	菌核病、灰色かび病	2000倍								
にんじん	すそ枯病	2000倍								
アスパラガス	菌核病、灰色かび病、うどんこ病	3000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内				
くきちや	茎枯病、斑点病、褐斑病	3000倍								
オクラ	灰色かび病	2000倍								
ねぎ	葉すす病、灰色かび病、うどんこ病	2000倍								
たまねぎ	小菌核腐敗病、さび病、黒斑病、葉枯病、小菌核病、黒腐菌核病、白絹病	3000倍								
にんにく	黒腐菌核病	1000倍								
にら	灰色かび病、小菌核病	2000~4000倍								
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	灰色腐敗病	2000~3000倍								
きく	1000~2000倍	—					定植直前	1回	5分間苗根部浸漬 5分間セル苗浸漬	5回以内(定植前は1回以内)
トルコギキョウ	灰色腐敗病	1000~2000倍					—	定植直前	1回	5分間苗根部浸漬 5分間セル苗浸漬
にんにく	葉枯病、白斑葉枯病、黄斑病、さび病	3000倍	100~300g/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
にら	褐色葉枯病、白斑葉枯病、さび病	3000倍								
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	灰色かび病	3000倍								
きく	灰色かび病、白さび病	3000倍								
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病	3000倍								
きく	灰色かび病、白さび病	3000倍								
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病	3000倍								
きく	灰色かび病、白さび病	3000倍								
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病	3000倍								
トルコギキョウ	灰色かび病、斑点病	3000倍								

*はなやさい類とは：・ブロッコリー・茎ブロッコリー(スティックセニョール)、・カリフラワー(はなやさい、さんごしょう、ロマネスコ、カリフローレ)

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- ぬれに使用する場合、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を生じるおそれがあるので、散布後十分に換気をおこなってください。
- スイピーへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- カラー及び花はすに使用する場合は、灌水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の養菜にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手術を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 水産動物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚場では使用しないでください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷凍・乾燥した場所に保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2024年11月現在の登録内容に基づいています。

果樹・野菜の病害防除の定番に!!

攻守に優れたミミラクルアシスト