

新登場!

(2025年上市予定)

殺虫剤



クミアイ

フィールドマスト®

フロアブル

順風満帆な栽培にマストなアイテム登場

幅広いアブラナ科作物に登録! 既存剤抵抗性害虫にも有効!



各種登録作物で適用害虫追加!
使いやすくなりました!

特長

- 1 コナガ・キスジノミハムシに高い効果
- 2 園芸剤として新しい作用機作
- 3 既存剤抵抗性害虫にも有効
- 4 ミツバチに安全性が高い

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクロロメゾチアズを含む農薬の総使用回数
結球あぶらな科 葉菜類 (キャベツ、はくさいを除く)	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ、ウワバ類 シロイチモジヨトウ、カブラハバチ類	4000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ、ウワバ類、シロイチモジヨトウ カブラハバチ類、ナモグリバエ						
はくさい	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ ウワバ類、シロイチモジヨトウ カブラハバチ類、キスジノミハムシ ダイコンハムシ						
だいこん	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ カブラハバチ類、ダイコンハムシ			収穫3日前まで			
はなやさい類※	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ、シロイチモジヨトウ						
非結球あぶらな科 葉菜類	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、 ハスモンヨトウ、キスジノミハムシ ナモグリバエ			収穫前日まで			
レタス類※	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ナモグリバエ						
かぶ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ カブラハバチ類						

※はなやさい類:カリフラワー、茎ブロッコリー、ブロッコリー、作物群内での作物間の交配種 ※レタス類:エンダイブ、トレビス、非結球レタス、ブントレタス、レタス

注意事項

- 使用前によく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しないでください。
- みずかけな(水掛菜)に使用する場合、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。
- 散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄してください。また、洗浄した廃液は河川等に流さないでください。
- 空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受ける事をおすすめします。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用してください。
- 本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 本剤は衣服(白衣)などに散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- アレルギー性反応を起こすおそれがあります。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。

● 使用前にラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。