

FMC

重要害虫の加害、即効ストップ。
美しい収穫へ。

**新規登録
 拡大!**

はくさい、レタス、
 非結球レタス、にんじんの
 「無人航空機による散布」
 たまねぎ使用時期
 「収穫前日まで」など

葉のすみずみまで浸達、高い効果を素早く発揮!
 葉裏や作物内部に侵入、加害する害虫も、取りこぼさない!

主な適用害虫



*1 提供: 柴尾学氏 *2 原図提供: 徳丸晋虫氏(京都府農林水産技術センター)



ジアミド剤のプロ **FMC** の卓効成分
 シアントラニリプロール (通称: サイアジビル®) を、**10.3%** 高配合!

葉裏まで
 すばやく浸達!
 長期
 残効!

クミアイ

野菜散布用殺虫剤

ベネビア® OD

powered by
CYAZYPYR®
 ACTIVE INGREDIENT



- 特長 1** 葉裏のすみずみまでしっかり浸達! 作物内部に侵入、加害する害虫も、取りこぼさない!
- 特長 2** 1成分で幅広い害虫に高い効果! 万全ローテーションの要になります。
- 特長 3** 長期残効で、大事な生育期、収穫期を守り切る!
- 特長 4** 効かなきゃ困る、重要害虫の産卵、吸汁・摂食、食入・食害を、害虫死を待たず**即効ストップ!** 害虫による**ウイルス媒介も抑制***!
- 特長 5** **ミツバチ・マルハナバチ** (散布翌日の放飼が可能) や**天敵にも安全**。混用事例も**豊富**です!

詳しい混用事例はこちらから →



*タバココナジラミによる、トマト黄化葉巻病、ミナミキイロアザミウマによる、きゅうり/メロン黄化えそ病

■適用害虫と使用方法

2025年1月15日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロロールを含む農薬の総使用回数										
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、ウリバ類、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)										
	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、ウリバ類、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、アブラムシ類、アザミウマ類、アブラムシ類	20倍	1~2ℓ/10a			無人航空機による散布											
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍				散布											
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、ウリバ類、シロイチモジヨトウ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a			散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)										
	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、ウリバ類、シロイチモジヨトウ、アブラムシ類、キスジノミハムシ	20倍	1~2ℓ/10a			無人航空機による散布											
	アブラムシ類、キスジノミハムシ	2000倍	100~300ℓ/10a			散布											
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバ(仔)類、ダイコンハムシ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a			無人航空機による散布	4回以内 (は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)										
	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバ(仔)類、ダイコンハムシ、アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノミハムシ、ヨトウムシ	20倍				1~2ℓ/10a		散布									
	アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノミハムシ、ヨトウムシ	2000倍															
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ	2000~4000倍	1~2ℓ/10a			収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)								
	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、アブラムシ類	20倍															
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍															
トマト ミニトマト	オオタバコガ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内			散布	5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)								
	ハモグリバエ類、コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、トマトキバガ	2000倍															
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ウリノメイガ、ウリハムシ	2000倍	100~300ℓ/10a					収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)						
	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ウリバ類、シロイチモジヨトウ									2000~4000倍							
レタス 非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ウリバ類、シロイチモジヨトウ	2000~4000倍	1~2ℓ/10a							収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)				
	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ウリバ類、シロイチモジヨトウ、ハモグリバエ類、アブラムシ類	20倍															
ピーマン	ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍	100~300ℓ/10a									収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)		
	オオタバコガ	2000~4000倍															
ししとう	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類	2000倍	100~300ℓ/10a											収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)
	オオタバコガ	2000~4000倍															
いちご	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、チバクロバネキノコバエ、カキノヒメヨコバイ	2000倍	100~300ℓ/10a			収穫前日まで	3回以内									散布	4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ハスモンヨトウ	2000~4000倍															
アスパラガス	ハスモンヨトウ	4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内											散布	3回以内
	アザミウマ類	2000倍															
オクラ	アブラムシ類	2000倍	100~300ℓ/10a					収穫前日まで	3回以内							散布	3回以内
	アブラムシ類	2000倍															
えだまめ	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、アブラムシ類	2000~4000倍	0.8~2.4ℓ/10a							収穫前日まで	3回以内					無人航空機による散布	4回以内 (は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)
	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、アブラムシ類	32倍															
だいず	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、アブラムシ類	2000~4000倍	0.8~2.4ℓ/10a									収穫7日前まで	3回以内			散布	4回以内 (は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)
	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、アブラムシ類	32倍															
さやいんげん	ハスモンヨトウ	4000倍	100~300ℓ/10a											収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハモグリバエ類	2000倍															
	アズキノメイガ	2000~4000倍															
かぼちゃ	ハスモンヨトウ	4000倍	1~2ℓ/10a			収穫前日まで	3回以内									無人航空機による散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))
	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	20倍															
ねぎ	ハモグリバエ類	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内											散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))
	シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ネギコガ	20倍															
たまねぎ	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	2000倍	100~300ℓ/10a					収穫前日まで	3回以内							無人航空機による散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))
	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	2000倍															
	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類	20倍															
にんにく	アザミウマ類、ネギコガ、アブラムシ類	2000~4000倍	100~300ℓ/10a							収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))				
	アザミウマ類、ネギコガ、アブラムシ類	2000倍															
	アザミウマ類、ネギコガ、アブラムシ類	20倍															
やまのいも	ナガイモコガ、ハスモンヨトウ	4000倍	100~300ℓ/10a									収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))		
	アブラムシ類、コガネムシ類	40倍															
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタハ、アリモドクソウムシ、イモソウムシ、ヨツシカメノコハムシ、ヒルガオハモグリガ、タバココナジラミ	4000倍	100~300ℓ/10a			収穫7日前まで	3回以内							散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))		
	ハスモンヨトウ	4000倍															
	ハスモンヨトウ	4000倍															
ばれいしょ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、ジャガイモガ	40倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内									無人航空機による散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))		
	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、ジャガイモガ	40倍															
	アブラムシ類、ジャガイモガ	2000倍															
にんじん	アブラムシ類	2000~4000倍	100~300ℓ/10a					収穫前日まで	3回以内					散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))		
	アブラムシ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、キアゲハ	40倍															
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、キアゲハ	4000倍															
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	2000倍	100~300ℓ/10a							収穫前日まで	3回以内			散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))		
	アブラムシ類	2000倍															
	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ、アブラムシ類	40倍															
たばこ	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a			収穫10日前まで	2回以内					無人航空機による散布	2回以内				
	ヨトウムシ、タバコノミハムシ	4000倍															

●ラベルをよく読んでください。●記載以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには置かないでください。●空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用してください。●防除日誌を記載しましょう。

2477(25-2) ©2025 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC、FMCロゴ、®を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

