

殺菌剤

どさんこ★スター[®]

水和剤



てんさい・たまねぎの
主要病害防除に
新星★登場!

©はクミアイ化学工業(株)の登録商標



てんさい楊斑病



てんさい葉腐病



たまねぎ灰色かび病
(白斑葉枯病)



たまねぎ小黒核病
(原図:池谷)



たまねぎへと病

殺菌剤

どさんこスター

水和剤

- 有効成分：フェンブコナゾール……………7.8%
マンゼブ……………66.5%
- 人畜毒性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)
- 販売地域：北海道




- (1) マンゼブが病原菌の感染を防ぎ、フェンブコナゾールが病気の進行を抑える2種混合の殺菌剤です。
- (2) 浸透性と長い残効性により、安定した効果を発揮します。
- (3) 異なる作用機構をもつ有効成分を混合することで、薬剤耐性菌の発達リスクを抑えます。

★適用作物と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェンブコナゾールを 含む農薬の総使用回数	マンゼブを含む 農薬の総使用回数
てんさい	褐斑病	125倍	25ℓ	収穫 21日前まで	4回以内	散布	4回以内	5回以内
	葉腐病	500倍	100～ 300ℓ					
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病 べと病				収穫 3日前まで	3回以内	3回以内	


★試験成績

●てんさいの褐斑病に対する効果



- 発生：多発生(接種) ●初発：7/17 ●品種：リッカ ●移植：4/28
- 区制：1区13.0m²、84株、3連制 ●散布：7/17, 23, 30, 8/7, 14の計5回。
所定濃度の薬剤に展着剤(グラミンS5000倍)を加用し、130ℓ/10aの割合で散布した。
- 調査：8/24(最終散布10日後)に各区中央部の30株について発病度を調査した。
- 無処理発病度：56.2

●たまねぎの小菌核病に対する効果



- 発生：中発生(接種) ●初発：6/22 ●品種：北もみじ2000 ●定植：4/25
- 区制：1区8.38m²、3連制 ●散布：6/13, 20, 28, 7/5, 12, 19の計6回。
所定濃度の薬剤に展着剤(グラミンS5,000倍)を加用し、150ℓ/10aの割合で散布した。
- 調査：7/27(最終散布8日後)に各畝10株(合計50株)について発病度を調査した。
- 無処理発病度：29.2

どさんこスター 上手な使い方

予防効果と治療効果を有するため、**発生前～発生初期に散布を行う**ことで優れた防除効果を発揮します。**てんさい**では葉が最も繁茂する7月中旬から、**たまねぎ**では6月中旬からが散布適期です。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
てんさい	生育ステージ	移植	至葉繁茂期				根部肥大型		収穫
	散布適期	残効期間を考慮しローテーション防除						散布適期 ※収穫21日前まで	
たまねぎ	生育ステージ	移植		球肥大型	倒伏期		収穫		
	散布適期	残効期間を考慮しローテーション防除						散布適期 ※収穫3日前まで	

⚠️ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- てんさいに対して希釈倍数125倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した速度運動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

⚠️ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、不透水性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするるとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

魚毒性等：散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
保管：直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

本資料は2018年10月現在の知見に基づき作成しています。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 防除日誌を記帳しましょう。