

作物をきれいに守る!



灰色かび病、うどんこ病に

よく振ってから
お使いください。



きゅうり 灰色かび病



トマト 灰色かび病



いちご 灰色かび病



ぶどう 灰色かび病



すいか うどんこ病



きゅうり うどんこ病



かんきつ 灰色かび病



いちご うどんこ病



ぶどう うどんこ病



ピーマン うどんこ病



自然に学び 自然を守る





フルピカで作物ピカピカ! 野菜・果樹類の 重要病害防除に!

●有効成分：メバニピリム……………40.0%

殺菌剤分類 **9**

●人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

特長

1. 独自の作用性を有する殺菌剤です。
2. 灰色かび病・うどんこ病に予防散布で安定した防除効果を発揮します。
3. 各種薬剤耐性灰色かび病・うどんこ病にも優れた効果があります。
4. 浸透性を有します。
5. 果実や葉の汚れが少なく使いやすいフロアブル剤です。
6. 残効性や耐雨性を有します。
7. 有用昆虫に対し、影響が少ない薬剤です。

セイヨウミツバチ、マルハナバチ、マメコバチ、コレマンアブラバチ、オンシツツヤコバチ
チリカブリダニ、ミヤコカブリダニ、スワルスキーカブリダニ、リモニカスカブリダニ
ククメリスカブリダニ、タイリクヒメハナカメムシ、タバコカスミカメ

*2000倍希釈で群体、訪花活動への影響なし

■適用病害と使用方法

*本剤及びメバニピリムを含む農業の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(&/10a)	使用時期	使用回数*	使用方法												
かんきつ	灰色かび病	2,000~3,000	200~700	開花期~幼果期 但し、収穫90日前まで	2回以内	散布												
りんご	黒星病	2,000~6,000		200~700	収穫21日前まで		5回以内											
	斑点落葉病	2,000~4,000																
	うどんこ病 モニリア病																	
なし	黒星病	2,000		200~700	収穫前日まで		5回以内											
もも	うどんこ病 灰星病																	
ぶどう	灰色かび病	2,000~3,000		100~300	収穫30日前まで		2回以内	散布										
	うどんこ病				収穫14日前まで		5回以内											
かき	灰色かび病	2,000~3,000			100~300		収穫7日前まで		3回以内									
							びわ		収穫14日前まで	5回以内								
いんげんまめ	2,000	100~300	収穫7日前まで			3回以内												
あずき			収穫14日前まで			5回以内												
ねぎ	小菌核腐敗病		2,000			100~300	収穫7日前まで		5回以内									
きゅうり	うどんこ病		2,000~3,000				100~300		収穫前日まで	4回以内								
	褐斑病																	
	灰色かび病																	
すいか メロン かぼちゃ	うどんこ病		67	100~300				10	常温煙霧									
トマト、ミニトマト	灰色かび病		2,000~3,000							100~300	10	4回以内						
					なす								黒枯病					
ピーマン パセリ	うどんこ病		67		100~300								10	常温煙霧				
		2,000																
いちご	うどんこ病	3,000	100~300												5	2回以内		
		50																
		100																
マンゴー ラズベリー	灰色かび病	2,000~3,000				100~300	2,000~3,000										100~300	3回以内
		2,000																
花き類・観葉植物 (ばら、スターチス、 宿根かすみそう、ゆり、 りんどうを除く)	うどんこ病 黒星病	2,000~3,000		100~300			2,000~3,000	100~300	5回以内									
										ばら	うどんこ病							
											黒星病							
スターチス 宿根かすみそう	灰色かび病	2,000			100~300		2,000	2,000										
	うどんこ病																	
ゆり	葉枯病	2,000~3,000	100~300				2,000~3,000	2,000~3,000										
	灰色かび病																	
りんどう	褐斑病	2,000					200~700	2,000		2,000								
	黒斑病																	
樹木類(かしを除く)	うどんこ病	2,000				200~700		2,000		2,000								
	灰色かび病																	
かし	紫かび病	2,000		200~700				2,000	2,000									
	紫かび病																	

フルピカの上手な使い方

●予防的散布(早めの散布)を重点に行ってください。

発生前や発生初期から予防的に散布(早めの散布)することで、優れた防除効果を発揮します。

●的確な散布を行ってください。

灰色かび病は多くの場合、花卉から感染します。感染しやすい部分に薬液が十分かかるように散布してください。

●連続使用はさけてください。

耐性菌対策のため、本剤の連続使用はさげ、作用性の異なる薬剤とのローテーションで使用してください。

●耕種的な防除を併用してください。

灰色かび病を防除するには、薬剤防除のみに頼ることなく、病害が発生しにくい環境を作ることが重要です。フルピカの防除効果は、耕種的な防除対策と併用することにより、安定した効果が得られます。

【注意事項】(抜粋)

- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器を良く振ってください。
 - おうちには薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう注意して散布してください。
 - りんごに使用する場合、開花直前から落花20日頃までの高濃度(2,000倍)散布は、つがる、ジョナゴールド等の葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
 - シクラメンに使用する場合、開花中の花卉に薬液が付着すると薬害が生じる場合があるので、開花期以降の散布はさけてください。
 - 適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
 - 皮ふに対して刺激性があるので、皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 - 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。
- ★空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから。



特設サイトはこちらから。



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2024年7月現在の知見に基づいて作成しています。 2425(24-8)

自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL.03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>