

自然に学び 自然を守る



農林水産省登録
第24072号



豊かな収穫へ行進!!

果樹用殺菌剤

パレード15 フォアガル



適用
拡大



登録商標



黒星病・輪紋病など

幅広い病害に高い効果を発揮!! 適用作物への薬害リスクが極めて低い!



りんご/黒星病



りんご/モニリア病



りんご/うどんこ病



りんご/褐斑病



なし/輪紋病



ぶどう/黒とう病

特長

パレード15フロアブルは新規有効成分「ピラジフルミド」を含有する果樹用SDHI殺菌剤です。

■幅広い病害スペクトラムを有します

黒星病、輪紋病、褐斑病、うどんこ病、灰星病等、幅広い病害に対し高い効果を示します。

■効果持続性に優れます

降雨の影響を受けにくく、また葉内への浸透性を有し効果持続性に優れます。

■適用作物への薬害リスクが低く、使いやすい薬剤です

適用作物に対する薬害リスクが低く、これまでの試験では適用作物への薬害発生事例はありません。幅広い作物で栽培期間を通して使いやすい薬剤です。

適用病害虫および使用方法

が2023年8月に適用拡大になりました

2023年8月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、斑点落葉病、輪紋病 すす点病、すす斑病、うどんこ病 褐斑病、灰色かび病、黒点病 モニリア病	2000～ 3000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	赤星病	2000倍					
おうとう	灰星病	2000～ 3000倍					
	幼果菌核病	2000倍					
なし	黒星病、輪紋病 うどんこ病、赤星病	2000～ 3000倍					
	黒斑病、褐色斑点病	2000倍					
もも	果実赤点病	2000倍					
ネクタリン	灰星病、黒星病、うどんこ病	2000～ 3000倍					
小粒核果類	すす斑病（うめ）	2000倍					
	黒星病、灰色かび病 灰星病（すもも）	2000～ 3000倍					
ぶどう	黒とう病、さび病 灰色かび病、褐斑病、うどんこ病		収穫7日前まで				
キウイフルーツ	灰色かび病		収穫前日まで				
かき	うどんこ病、落葉病	2000～ 3000倍	4～5ℓ/10a 8～10ℓ/10a 200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	無人航空機 による散布	散布	
	灰色かび病						
	そうか病						
	黒点病						

注意事項

■薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。

■ぶどうの幼果期（小豆大）以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさけてください。

■無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。

- ①散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
- ②散布に当っては散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
- ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ④散布薬液の飛散によって自動車やカートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑤散布終了後は次の事項を守ってください。

(a)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。

(b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。

■適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましく、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

■散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

■作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

■かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

