

# フィールドマストフロアブル（殺虫剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクロロメチアスを含む農薬の総使用回数
かぶ	コナガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ アオムシ	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
だいこん	コナガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ アオムシ			収穫3日前まで			
はなやさい類	コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ						
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ キスジノミハムシ ナモクリハエ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ			収穫前日まで			
結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く)	ウワバチ類 コナガ カブラハバチ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ						


適用拡大登録月日：2024年08月28日

# フィールドマストフロアブル（殺虫剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクロロメチアスを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ウワバ類 コナガ カブラハバチ類 ナメグリバエ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
はくさい	ウワバ類 コナガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダクイコンハムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ						
レタス類	ナメグリバエ ヨトウムシ ハスモンヨトウ						

 適用拡大登録月日：2024年08月28日