

各位

全4ページ

登録速報(2024-182)
2024年10月 2日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部 普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2024年10月2日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 : 第23479号
名称 : クミアイガスタード微粒剤

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中に、以下の事項を追加及び変更し、【変更後】のとおりとする。

- ①作物名「セネガ」を追加する。
- ②作物名「しゃくやく(薬用)」を追加する。
- ③作物名「薬用ごぼう」を追加する。
- ③作物名「にんにく」「わけぎ」「らっきょう」及び「にら」に適用病害虫名「黒腐菌核病」を追加する。

【変更後】（追加及び変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメット を 含む農薬の 総使用回数
<u>セネガ</u>	一年生雑草	30kg/10a	は種又は 定植前	1回	本剤の所定量を 均一に散布して 土壌と混和す る。	1回
<u>しゃくやく (薬用)</u>	根黒斑病	30～40 kg/10a	植付前			
	白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～30 kg/10a				
<u>薬用ごぼ う</u>	萎凋病 黒あざ病 一年生雑草	20～30 kg/10a	は種又は 定植前			
<u>にんにく</u>	<u>黒腐菌核病</u> イモグサレセンチ ユウ 白絹病 紅色根腐病 一年生雑草	30kg/10a	植付28日 前まで			
<u>わけぎ</u>	<u>黒腐菌核病</u>	30kg/10a	は種又は定植 21日前まで			
	苗立枯病 (リゾクトニア菌) 一年生雑草	20～30 kg/10a				
<u>らっきよ う</u>	<u>黒腐菌核病</u> 根腐病 乾腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	30kg/10a	植付21日 前まで			
<u>にら</u>	<u>黒腐菌核病</u> 乾腐病 紅色根腐病 白絹病	30kg/10a	は種又は定植 21日前まで			
	一年生雑草	30～60 kg/10a				

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
農薬登録申請書第8項の(12)を以下のとおり変更し、【変更後】のとおりとする。

- (12)ごぼう及び薬用ごぼうに使用する場合は生育抑制・岐根等の薬害を生じるおそれがあるので、処理からは種までの期間を十分とり、ガス抜きをていねいに行い、発芽テスト等で安全を確認の上、は種すること。

【変更後】

8. 使用上の注意事項

- (1)使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- (2)本剤を処理する前に耕起整地すること。
- (3)本剤は土壌中の水分によって分解し、ガスを発生することによって効果を発揮するもので、土壌の種類、水分含量、温度等により効果にふれが出るので、以下のことに十分留意すること。
- ①地温が10℃以下のときには使用しないこと。
- ②砂質土壌や乾燥した土壌で使用する場合は、ていねいに混和した後灌水して適度の水分を与えてから被覆すること。
- ③次の場合はガスの拡散が遅いので被覆期間を適宜延長すること。
- ア. 重粘土質の土壌の場合
- イ. 降雨などにより土壌水分が多い場合
- ウ. 地温が低い(15℃以下)場合
- (4)センチュウが多発する条件、或いはトマト、なすではセンチュウ類に対する効果が劣る場合があるので、センチュウを防除対象とする場合には、他の防除方法と併用して使用すること。
- (5)ガス抜きが不十分であると薬害が生じるおそれがあるので、少なくとも2回は耕起によるガス抜きを実施すること。なお、ガス拡散の遅い条件の場合は特にていねいに行うこと。
- (6)本剤を全面に処理する場合、深さ15～25cmに土壌と十分に混和すること。特に、やまのいもに使用する場合は、深さ50～60cmに土壌と十分に混和すること。混和後ビニール等で被覆または鎮圧散水してガスの蒸散を防ぐこと。7～14日後被覆を除去して、ガス抜きを行うこと。
- (7)本剤を苗立枯病または芝の目土用土に処理する場合、本剤を十分混和後ビニール等で被覆し、7～14日後被覆を除去して、ガス抜きを行うこと。
- (8)本剤が作物に直接ふれると薬害を生じるので、周辺に作物がある場合にはかからないように十分間隔をおいて薬剤を処理すること。
- (9)温室やビニールハウスなどの施設内に作物がある場合、薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。
- (10)りんご、桑、なし及びぶどうに使用する場合は、被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに本剤を散布し、深さ25～40cm(りんごの場合は深さ40cm)に土壌と均一に混和すること。本剤処理20日後に被覆を除去して耕起し、翌春に植え付けること。また、りんご、なし及びぶどうでは、植え付けた年は果実を収穫しないこと。
- (11)樹木類に使用する場合は、以下の点に注意すること。
- ①南根腐病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合は、行政機関等(県、市町村)から南根腐病の発生地域として指定された防除を必要とする場所での使用に限ること。また、安全管理及び使用方法については、沖縄県の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮すること。
- ②ならたけ病菌の密度低減及びならたけもどき病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合は、安全管理及び使用方法については、各都道府県の森林組合連合会、また林業試験場の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮すること。

- ③被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに本剤を散布し、深さ45cmに土壌と均一に混和し、ガスバリアー性フィルムで被覆すること。本剤処理30日後に被覆を除去して耕起し、植え付けること。
- (12) ごぼう 及び薬用ごぼうに使用する場合は生育抑制・岐根等の薬害を生じるおそれがあるので、処理からは種までの期間を十分とり、ガス抜きをていねいに行い、発芽テスト等で安全を確認の上、は種すること。
- (13) しょうが及び葉しょうがの根茎腐敗病に対しては、多発生条件では効果が不十分な場合があるので注意すること。
- (14) は種又は定植の20～10日前に使用する場合は、地温20℃以上の条件に限って使用すること。
- (15) 芝の目土に処理する場合は、目土中に含まれる雑草種子を殺す目的で目土を処理するものであるため除草剤として、芝に直接散布することのないように注意すること。
- (16) 葉たまねぎ(苗床)及びたまねぎのは種14日前までに使用する場合は、本剤を均一に散布後、レーキ等で浅く(2～3cm)混和し、ビニール等で被覆すること。7日後に被覆を除去し、さらにその後7日間放置し、は種前にレーキ等で浅く整地しガス抜きを行うこと。
- (17) たまねぎのべと病は感染力が強く拡がりやすい病害のため、散布剤との体系処理を行い、感染防除に努めること。
- (18) たまねぎに秋期に使用する場合は、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆すること。約20日後に被覆を除去してガス抜きを行うこと。は種は翌春に行うこと。
- (19) ほうれんそうのハウレンソウケナガコナダニに使用量10kgで使用する場合は、本剤を均一に散布後、レーキ等で浅く(2～3cm)混和し、ビニール等で被覆すること。5～10日後に被覆を除去し、は種前にレーキ等で浅く整地しガス抜きを行うこと。
- (20) てんさいに秋期に使用する場合は、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆すること。約20日後に被覆を除去してガス抜きを行うこと。は種は翌春に行うこと。
- (21) たばこに使用する場合は、次のことに注意すること。
- ①秋期に使用する場合は、本剤を均一に散布後、十分混和すること。混和後鎮圧してガスの蒸散を防ぎ翌春耕起した後、植え付けること。
- ②春期に使用する場合は、本剤を散布後、十分混和すること。混和後そのまま放置し、2週間後に畦立てをし、その2日後にビニール等で被覆すること。さらに2週間後に植え付けること。
- (22) ミツバチの巣箱周辺での使用はさけること。
- (23) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (24) 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上