

各位

全3ページ  
登録速報(2024-200)  
2024年10月30日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

### 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。  
適用拡大登録年月日：2024年10月30日

#### 記

#### 1 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第16123号

名称：クミアイバサグラン粒剤（ナトリウム塩）

#### 2 変更の内容

農薬登録申請書第7項を以下のように変更し、変更後のとおりとする。

- (1) 作物名「移植水稻」の使用時期「移植後15～55日 但し 収穫60日前まで」を「移植後15日～収穫45日前まで」に変更する。
- (2) 作物名「直播水稻」の使用時期「稲3葉期～入水50日後 但し 収穫60日前まで」を「稲3葉期～収穫45日前まで」に変更する。
- (3) 作物名「移植水稻」及び「直播水稻」の適用雑草名「水田一年生雑草(イネ科を除く)」を「一年生雑草(イネ科を除く)」に変更する。

(変更後) (変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ベンザンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	<u>一年生雑草 (イネ科を除く)</u> マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤヌカグサ シズイ	<u>移植後15日～ 収穫45日前まで</u>	3～4kg/10a	1回	落水散布 又は ごく浅く 湛水して 散布	2回以内
直播水稻	<u>一年生雑草 (イネ科を除く)</u> マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	<u>稲3葉期～ 収穫45日前まで</u>	3kg/10a			

3 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容  
農薬登録申請書第8項(2)を以下のとおり変更し、別紙のとおりとする。

(2) イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を  
防除した後、多年生雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用すること。

## 8. 使用上の注意事項

- (1) 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
  - イ) 使用にあたっては落水状態（足跡に水が残っている状態）にして水の出入りをとめ、まきむらのないように均一に散布すること。
  - ロ) 水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないように均一に散布すること。
  - ハ) 散布後少なくとも3日間（浅水処理は5日間）はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしないこと。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しないこと。
  - ニ) 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用すること。
  - ホ) 深水にすると効果が劣るので注意すること。
- (2) イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、**多年生雑草**及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用すること。
- (3) 砂質土及び漏水のはげしい水田では使用しないこと。（減水深2 cm/日以上）
- (4) 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布すること。  
ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生揃期まで、クログワイでは草丈15 cm以下、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30 cmが本剤散布の適期である。
- (5) クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用すること。
- (6) 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上