

各位

全2ページ  
登録速報(2025-070)  
2025年 3月10日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り、注意事項変更届けを提出しましたので、ご連絡します。

提出日：2025年3月5日

(注意事項は届けを提出した段階で、登録変更となります)

## 記

### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第21577号

名称 クミアイストライド顆粒水和剤

### 2. 受付年月日

令和7年3月5日

### 3. 変更を生じた事項及び変更の内容

農薬登録申請書第8項「使用上の注意事項」の(4)を以下のとおり変更し、(5)を新たに追加、以降の番号をそれぞれ繰り下げ、別紙のとおりとする。

#### 【変更】

(4) りんごに使用する場合、品種によって葉裏が茶褐色をおびることがあるが、通常、実用上の影響は認められていない。但し、樹勢の弱い樹でとくに品種「スターキング」では梅雨明け頃の高温時の散布において、落葉を助長するおそれがあるので使用しないこと。

#### 【追加】

(5) 西洋なしに使用する場合、品種によって葉裏が茶褐色をおびることがあるが、通常、実用上の影響は認められていない。但し、品種「ル レクチエ」については果実に薬害を生じるおそれがあるので袋かけ前には使用しないこと。

### 4. 変更の理由

使用上の注意事項をより適切なものにするため。

## 別紙

### 8. 使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) 調製した薬液はできるだけ速く、その日のうちに散布すること。
- (3) 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけること。
- (4) りんごに使用する場合、品種によって葉裏が茶褐色をおびることがあるが、通常、実用上の影響は認められていない。但し、樹勢の弱い樹でとくに品種「スターキング」では梅雨明け頃の高温時の散布において、落葉を助長するおそれがあるので使用しないこと。
- (5) 西洋なしに使用する場合、品種によって葉裏が茶褐色をおびることがあるが、通常、実用上の影響は認められていない。但し、品種「ル レクチエ」については果実に薬害を生じるおそれがあるので袋かけ前には使用しないこと。
- (6) いちご、日本なしには薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布すること。
- (7) かきに使用する場合は次のことに注意すること。
  - ① M E P 乳剤との混用散布及び7日以内の近接散布は薬害を生じる場合があるのでさけること。
  - ② 夏期高温時の他の薬剤との混用散布は薬害を生じる場合があるのでさけること。
- (8) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (9) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上